



FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF HVEPSE

HJÆLP MOD HVEPSE

Med sommeren kommer hvepsene, og det giver problemer mange steder, hvor der laves mad eller handles med fødevarer som f.eks. brød, frugt og grønt.

Hvepsene ødelægger ved at gnave i maden, og da de også holder til på ådsler, i skraldespande og lignende steder, kan de også være smittebærere. Hvepse er desuden irriterende, når de sværmer ved restauranter, pølsevogne og iskiosker.

MORTALIN har midler til forebyggelse og bekæmpelse af hvepse.

Indendørs er UV-lysfælder det mest effektive middel, da det ultraviolette lys tiltrækker hvepsene, så de flyver ind i fælden.

Udendørs bekæmpes hvepsene bedst, hvis man finder boet, og slår hvepsene ihjel.

Hvis man ikke kan finde boet, kan man bruge en fælde, som tiltrækker hvepsene med et lokkemiddel og fanger dem, når de flyver ind og spiser.

NOGET OM HVEPSE

Hvepsene med de sort-gule tegninger og den karakteristiske kropsform kaldes de sociale gedehamse.

I Danmark findes der 7 forskellige arter. Et gedehamse-samfund består af dronninger, hanner og arbejdere. Arbejderne er små hunner med udviklede kønsorganer. Hos dronninger og arbejdere ender bagkroppen i en brod, der står i forbindelse med en giftkirtel, som benyttes som våben.

Gedehamse-samfundet er etårigt og går til grunde hvert efterår. Det er kun de befrugtede dronninger fra hvert bo, som overvintrer. Næste forår må de "starte på en frisk".

Gedehamsene bruger kun boet en sæson. Boets fysiske placering afhænger i nogen grad af arten. Nogle foretrækker huller i jorden, som f.eks. gamle musereder eller muldvarpegange, mens andre bygger boet i træer og buske, hule træer, under tagudhæng eller på lofter.

Dronningerne kommer frem fra deres vinterhi midt i april og går straks i gang med at finde et passende sted til det nye bo. Den rede, som dronningen bygger, er kuglerund, stor som en valnød og har 10-20 celler til yngel.

Dronningen passer selv larverne, men når det første hold arbejdere, efter en måneds tid, er kommet på vingerne, koncentrerer hun sig om æglægningen. De nye arbejdere bygger boet større, passer larverne og henter føde.

Hvepseboet vokser sig større sommeren igennem og er størst i august, hvor det kan huse flere tusinde individer og være større end en fodbold.

Sidst på sommeren bygges et antal større larveceller, hvori dronning og hanner opfostres. Herefter flyver de ud på bryllupsflugt og parrer sig. Hannerne dør, og de nye befrugtede dronninger opsøger beskyttede skjul for at overvintrere.

HVEPSESTIK

Gedehamsenes gift er beslægtet med slangegift, og stikket kan være ret smertefuld.

Et gedehamse-/hvepsestik er kun sjældent farligt, da det er små mængder gift, der er tale om. I de tilfælde hvor folk bliver alvorligt syge af gedehamsestik, skyldes det, at personen er overfølsom over for et eller flere af de stoffer, der indgår i giften.

Også stik i mund eller hals kan give komplikationer, da slimhinderne kan svulme voldsomt op med åndedrætsbesvær til følge.

Et almindeligt ukompliceret stik behandles med salmiakspiritus eller alkohol og kolde omslag. I håndkøb kan man få salve med lidocain, der er lokalbedøvende.

Bliver den stukne person bleg og føler sig utilpas med svimmelhed, kvalme osv., bør man straks søge lægehjælp.

Stik af den store gedehams er mere smertefulde, fordi dosis er større.



MORTALIN

A/S MORTALIN
Bråbyvej 74-76
4690 Haslev
Telefon 56 31 10 69
Telefax 56 31 19 69
info@mortalin.dk

www.mortalin.dk

– der er viden til forskel

