



FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF MYRER

Når foråret kommer, kommer myrerne – og specielt de sorte havemyrer er ikke særlig velkomne, for de trænger ind i bygninger, hvor de i større antal er generende og uhygiejnske. Hvis de slår sig ned, kan de endda forårsage ødelæggelser i bygningskonstruktioner.

MYRER OG BYGNINGER

Myrerne er dygtige entreprenører, og kan hurtigt underminere fundamenter, sokler, fliser og lignende, når de graver deres lange gange.

Det er oftest bygninger – f.eks. parcelhuse – som er støbt direkte på jorden, der får "besøg" af havemyrer. De slår sig ned i isoleringen under huset og trænger op gennem revner i fundament, murværk, rør og paneler.

Det første tegn på, at der er myrer i bygningen, er små bunker af sand og grus langs panelerne. Bunkerne "tjener som lossepladser", og her kan være insektræster, tomme puppehylstre og døde myrer.

Tager myrer ophold i bygninger, kan de i værste fald underminere gulve. Har de etableret bo nær træværk, kan fugt fra boet medføre, at træværket bliver ødelagt.

MYRER OG MENNESKERS MAD

Myrer kan lide menneskers mad – gerne søde sager, som frugt, marmelade, saft, kager, m.m. Og det kan være et stort problem i institutioner, hvor små børn, handicappede og ældre har svært ved at se de små dyr.

Det er også et hygiejneproblem, når myrerne, ved deres adfærd, overfører bakterier til madvarer.

En myre bliver hurtigt til mange – for når arbejdermyrerne finder noget godt, "fortæller" de det til deres artsfæller, og snart kan en karavane af myrer være på vej til "spisekammeret".

MYRER OG DERES BIOLOGI

Den sorte havemyrer (*Lasius niger*) er almindelig i haver, på veje og gårdspladser. Det er også den myre, man oftest ser ved og i huse.

Et myresamfund kan være på 5-10.000 medlemmer og består af dronninger, vingede hanner og vingede arbejdere. Arbejderne er vingeløse hunmyrer, uden udviklede æggestokke, og det er disse myrer, der tager sig af det "praktiske arbejde".

Myrerne bygger normalt reder i jorden og ofte under sten og fliser. Men de kan også bo i rådne stubbe eller i fugtskadede træ i huse.

Den sorte havemyre lever primært af søde væsker – i naturen især af bladlus-ekskremitter, men de søger gerne indendørs efter føde.

En gang om året, hen på sommeren, kommer de flyvende havemyrer i sværme. De vingede myrer, hvor de store er hunner og de små er hanner, blander sig med sværmende myrer fra andre boer og parrer sig.

Hannerne dør, og de hunner, som ikke går til grunde, forsøger at opbygge nye samfund, og hvis det lykkes, bruger de resten af deres liv til at lægge æg.

PROFESSIONEL BEKÆMPELSE AF MYRER

• Udvendig, forebyggende behandling

Der sprøjtes på soklen, under sålbænke og andre relevante steder rundt om bygningen – eventuelt også på flisearealer, som støder direkte op til bygningen, så der dannes en barriere mod indtrængen af myrer.

• Indvendig behandling/bekæmpelse

Der behandles normalt ikke forebyggende indendørs. Men er der behov, bekæmpes myrerne der, hvor de opholder sig – f.eks. langs fodpaneler, dørkarme, i revner og sprækker.

• Myreboer under gulve og i vægge

Observerer man myrer indendørs om vinteren, er der et myrebo i huset – typisk under et gulv, f.eks. et opvarmet badeværelsesgulv. Er der kælder eller krybekælder under bygningen, kan myrerne også komme herfra.



MORTALIN

A/S MORTALIN
Bråbyvej 74-76
4690 Haslev
Telefon 56 31 10 69
Telefax 56 31 19 69
info@mortalin.dk

www.mortalin.dk

– der er viden til forskel

