

Proff
Til professionel brug

TANACO

Rotteblok Pro

GNAVERMIDDEL (PT14)

Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter og husmus i og omkring bygninger, og kun i en afstand op til 10 m fra en bygning samt til bekæmpelse af brun rotte i kloaker af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 m fra bygninger fungerer som kilde til rotter i bygninger.

20g blokke, 10kg

YDOO

- FARE**
Kan skade forplantningseveren. Mistænkt for at skade det ufødte barn (H360D).
Forårsage organskader blod ved længevarende eller gentagen eksponering (H373).
Bær beskyttelseshandsker.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt forpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejde.
Overtredelse af nedestående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
- **Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte og husmus i og omkring bygninger, og kun i en afstand op til 10 m fra en bygning samt til bekæmpelse af brun rotte i kloaker af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 m fra bygninger fungerer som kilde til rotter i bygninger.**
 - **Ved kildebekæmpelse skal betingelser i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt.**
 - **Dosering af midlet skal afpasses til bekæmpelsen af mus eller rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højst anvendes 200 g middel pr. 5 meter for rotter og 40 g pr. 2 meter for mus af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.**
 - **Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**
 - **For brug i og omkring bygninger og til kildebekæmpelse: Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.**
 - **For brug i kloaker: Det biocidholdige produkt skal fastgøres i kloakken, så det ikke kan skylles væk.**
 - **Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfrugte og rovdyr skal døde mus og rotter eftersejges to gange ugentligt efter behov og bortskaffes som dagrenovation. Rester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.**
 - **Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det foregår, at bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.**
 - **Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger. Må ikke tæmmes i kloakafløb.**
 - **Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.**
 - **Opbevares sammen med fedtvarer, fodervarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Der må ikke spises, drikkes eller rygges under brugen af dette produkt.
Første forgiftningssymptomer: træthed, appetitløshed og øget tendens til blødning.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder blodkoagulationshæmmende stof, og at KI-vitamin kan benyttes som modgift.

Brugsanvisning
Tanaco Rotteblok Pro er klar til brug og særlig velegnet til bekæmpelse i områder, hvor fugt, væde og andre forhold gør effektiv bekæmpelse vanskelig. Midlet har en tilfugt, langsom virkning. Der unlægges op til 10 blokke med 5-10 meters mellemrum, hvor der ses spor efter rotter. Det anbefales at udlægge giften i giftestationer, dels for at beskytte det øvrige liv på den pågældende lokalitet, dels at beskytte blokkene fra nedbrydelse. Samtidigt vil de lukkede giftestationer virke som en afskærmning, og på denne måde kan rotterne æde uforstyrret. Blokke der opdagges uden for udlægningsstederne skal straks indsamles. Det varer ofte et par dage, før rotterne begynder at æde af den udlagte gift. Det er af stor betydning, at der i hele bekæmpelsesperioden er udlagt tilstrækkelige mængder, og der bør derfor i starten suppleres jævnlige. Man bør læde giften ligge en uges tid, efter at rotterne er holdt op med at æde. Når bekæmpelsen er afsluttet indsamles giftrester og døde rotter.
Børn og husdyr skal holdes væk fra giften og særligt i svinehuse må man udvise forholdsregler for forsigtighed, da svin er særligt følsomme overfor giften. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. **Emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.**

Deklaration:

Gnavermiddel BPD-reg.nr. 736-5

Aktivstoffet er godkendt efter biociddirektivet (98/9/EF).

Midlet er godkendt efter

bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Præparat type: Blok

Analyse: Bromadiolon 0,005%ww, 0,05 g/kg ved 20°C.

Indeholder 1,2-benzotriazol-3-one og

2-ocyl-2H-isotiazol-3-one.

kan udløse allergisk reaktion.

Batch.nr. og udløbsdato: Se stempel

Indhold: 20g blokke - i alt 10 kg

Cocklestadsejendomme:

Regler International Ltd.

Nyboen Lane 13

CUDS 24N, Akon, Hampshire



2035-4

TANACO A/S (Trading as Pelist Denmark)
Gjentvejl 11 · DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 48 00 · Fax 75 14 31 84
kontakt@pelists.com · www.tanaco.com

COPY

COPY