

GNAVERMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter fra en bygning. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1- autorisation. Må kun udleveres til og besiddes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1-autorisation. Må kun anvendes i aflåste foderstationer, så mennesker og andre dyr end mus ikke kan komme i kontakt med giften.

BRUGSANVISNING

Målorganismer	Produkt pr. station	anvendelsesområde	angreb	Afstand mellem hver station
Husmus	50 g	i og omkring bygninger	Omfattende angreb	1-1.5 meters
			Begrænset angreb	2-3 meters

Læs og følg etiketten samt alle andre oplysninger, som ledsager produktet eller udleveres på salgsstedet, inden produktet tages i brug. Foretag en vurdering af skadedyrsangrebet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger inden produktet anvendes. Fjern fødevarer, som skadedyrene let kan få fat i (f.eks. spildt korn eller madaffald). Bortset fra dette skal det inficerede område ikke rengøres umiddelbart inden behandlingen, da dette kun forstyrrer skadedyrene og gør det sværere at få dem til at spise af produktet. Produktet bør kun anvendes som led i en overordnet bekæmpelsesstrategi. Produktet bør anbringes i umiddelbar nærhed af steder, hvor der tidligere har været gnaveraktiviteter (f.eks. stier, reder, indhegninger, huller og huler mv.). Om muligt bør foderstationerne fastgøres til jorden eller andre konstruktioner. Produktet bør fastgøres, så det ikke kan trækkes væk fra foderstationen. Anbring produktet i sikker afstand af fødevarer, drikkevarer og foderstoffer samt redskaber eller overflader, som har kontakt med disse. Hyppigheden af besøg i det behandlede område bør vurderes af bekæmperen i lyset af den undersøgelse, som blev foretaget ved behandlingens start. Denne hyppighed bør være i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Hvis produktet optages langsomt i forhold til angrebets tilsyneladende størrelse, overvejes det at flytte foderstationerne til andre steder og eventuelt skifte til et produkt baseret på et andet aktivstof. Hvis produktet efter en behandlingsperiode på 35 dage fortsat indtages, og der ikke observeres nogen nedgang i gnaveraktiviteten, skal den sandsynlige årsag bestemmes. Hvis andre elementer er blevet udelukket, er der sandsynligvis tale om resistens, og det bør overvejes at anvende et ikke-antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere rodenticid med antikoagulerende effekt. Overvej også at bruge fælder som alternativ bekæmpelsesforanstaltning. Overvej præventive kontrolforanstaltninger (tilstop huller, og fjern så vidt muligt potentielle føde- og drikkekilder) for at øge indtagelsen af produktet og mindske sandsynligheden for nye angreb. Fjern det resterende Produkt eller foderstationerne ved slutningen af bekæmpelsen. Beskyt produktet mod vejrforhold. Anbring foderstationerne i områder, der ikke oversvømmes. Udskift produktet i stationer, som er beskadiget af vand eller forurenet af jord. På grund af den forsinkede virkningsmekanisme tager rodenticider med antikoagulerende effekt fra fire til 10 dage om at virke efter indtagelse. Gnavere kan være sygdomsbærere. Rør ikke ved døde gnavere med bare hænder; brug handsker eller redskaber, såsom en tang, til at fjerne dem.

Dette produkt indeholder et bitterstof og et farvestof. Foderstationer skal mærkes med følgende oplysninger: "må ikke fjernes eller åbnes", "indeholder et rodenticid", "produktnavn eller tilladelsesnummer", "aktivt stof eller aktive stoffer" og "i tilfælde af uheld kontaktes en giftoptionscentral ".

FORSIGTIG

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen ikke kan komme i kontakt med giften. Døde mus skal eftersøges to gange ugentligt (eller efter behov i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger) og bortskaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovugle og rovdyr. Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen. Giftræster og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse. Følg eventuelle yderligere anvisninger i Miljøstyrelsens vejledninger. Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på den, der udfører bekæmpelsen (bekæmpelsesfirma og/eller kommune). Hvis produktet anvendes på offentlige områder, bør de behandlede områder afmærkes i behandlingsperioden, og sammen med foderstationen skal der opsættes en notits om risikoen ved primær eller sekundær forgiftning med det antikoagulerende middel med angivelse af førstehjælp

i tilfælde af forgiftning. Anbring produktet utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr, husdyr og andre dyr, som produktet ikke er rettet mod. Bær beskyttelseshandsker, som beskytter mod kemikalier under håndteringen af produktet. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger. Ved anbringelse af foderstationer tæt på overfladevand eller afløbssystemer skal det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand. Må ikke bruges ved intervaludlægning. Anvend ikke dette produkt direkte i rottegange. Må ikke tømmes i kloakafløb. Informer om muligt eventuelle brugere af det behandlede område og omgivelser om bekæmpelsen inden den indledes (i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger). Må ikke anvendes i områder, hvor der kan være mistanke om resistens over for aktivstoffet. Skift ikke mellem forskellige antikoagulerende midler med sammenlignelig eller svagere styrke med henblik på resistensstyring. Ved skift mellem produkter bør det overvejes at anvende et ikke-antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere antikoagulerende middel. Vask ikke foderstationerne med vand mellem anvendelserne. Bortskaf døde skadedyr som dagrenovation.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Søg lægehjælp ved ubehag. Dette produkt indeholder et antikoagulerende stof. Ved indtagelse kan der forekomme forsinkede symptomer, såsom næseblod og blødende tandkød. I svære tilfælde kan der forekomme blå mærker og blod i afføring eller urin. Modgift: K1-vitamin; må kun administreres af medicinsk/veterinært personale. Hvis produktet:- kommer på huden, vaskes huden med vand og sæbe. - kommer i øjnene, skylles øjnene med gjenrenseveske eller vand; hold øjnene åbne i mindst 10 minutter. - kommer i munden, skylles munden grundigt med vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald ikke opkastning. Hvis produktet synkes, søges der straks lægehjælp. Vis produktets beholder eller etiketten til lægen. Kontakt en dyrlæge, hvis produktet indtages af et kæledyr.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr og husdyr. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares tørt og køligt på et sted med god ventilation. Hold beholderen lukket og væk fra direkte sollys.

AFFALDSHÅNDTERING

Når bekæmpelsen er slut, skal uspist produkt og emballagen afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

GENERATION® BLOK - UFI : R310-G0G2-900H-SR3V

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 716-3. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)
Producent og godkendelsesindehaver : LIPHATECH S.A.S. Tel: 0033 (0)5 53 69 35 70 - Bonnel - CS10005 - 47480 Pont du Casse – FRANCE
Indhold: 0,0025 % Difethialon (0,025 g/kg) (CAS-nr. 104653-34-1)
Formulering: voksblok (klar til brug) - Produkttype : PT-14 Rodenticid
Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation - Målorganismer husmus (Mus musculus) - Anvendelsesområde : i og omkring bygninger

H373: Kan forårsage organskader (blod) ved længerevarende eller gentagen eksponering
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen contents/container i according to local legislation.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask huden efter arbejde. Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet (EN374-1: 2003 - latex eller tilsvarende)

Farligt for dyrelivet. Farlig for hunde og/eller katte.
Udløbsdatoen: Se på sækken. Batchnummer: Se på sækken



Distributør :
Tanaco Danmark A/S - Glentevej 11 - 6705 Esbjerg
Tlf.: 75144800
© registrerede mærker LIPHATECH



ADVARSEL