

# MAKI ROTTEPASTA



**ROTTER OG MUS**

**Indhold : 0,005% BROMADIOLON**

**VED KRAFTIG  
INFESTATION**



**Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen**

**LIPHA**TECH

**NETTOVÆGT :  
5kg**

## BRUGSANVISNING

Til bekæmpelse af rotter og mus i og omkring bygninger. Produktet virker i løbet af 4-6 dage efter indtagelse. Anvend handsker under håndteringen og udlægningen af bekæmpelsesmidlet. Vask hænder efter arbejdet. Bekæmpelsesmidlet skal være sikkert fastgjort så risikoen for forgiftninger af børn, kæledyr og husdyr er minimeret. Det anbefales at anvende aflåste depoter. Når bekæmpelsesmidlet anvendes direkte i åbne gangsystemer skal det være placeret under jordoverfladen og tilgængeligheden fra oven forhindret ved f.eks. en tung flise.

## TIDSPUNKT FOR ANVENDELSE

Hele året  
Posen skal ikke åbnes, men placeres direkte på udlægningsstedet

Sted	befængthedsgrad		Dosering	Anbefalede tilsyn
I og omkring bygninger	Høj	Mus	Udlæg op til 50 g/ udlægningssted med 1 – 1,5 m mellemrum	I og omkring bygninger: Tilse udlægningsstederne efter 3 dage, herefter hver eller hver anden uge.
		Rotter	Udlæg op til 200 g/ udlægningssted med 4 – 5 m mellemrum	
	Lav	Mus	Udlæg op til 50 g/ udlægningssted med 2 – 3 m mellemrum	I og omkring bygninger: Tilse 1 uge herefter udlægning, her efter hver eller hver anden uge.
		Rotter	Udlæg op til 200 g/ udlægningssted med 8 – 10 m mellemrum	
Affaldsdeponier		Rotter	Udlæg op til 200 g/ udlægningssted med 4 – 5 m mellemrum	Det anbefales at udlægge bekæmpelsesmiddel hver 2.-3. måned

MUS : Tilpas antallet af poser op til maksimalt 50 g.  
ROTTER : Tilpas antal af poser op til maksimalt 200 g  
Supplering : Ved hvert tilsyn suppleres mængden af bekæmpelsesmidlet op til 50 g «(mus) eller 200 g (rotter)», også selvom giften kun delvist er blevet spist, indtil gnaveraktiviteten er ophørt.  
Den autoriserede skadedyrsbekæmper vil vurdere udlægningsperiodens varighed afhængig af angrebets alvorlighed (2-5 uger). Under bekæmpelsesforløbet skal døde gnavere så vidt muligt indsamles – dels af hygiejnemæssige hensyn, dels for at undgå at de ædes af rovdyr.  
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning.  
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen.** Doseringen af midlet skal afpasses bekæmpelsen af mus eller rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højst anvendes 200 g middel pr. 4 meter for rotter og 50 g pr. 1 meter for mus af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.  
**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

Midlet skal anbringes i lukkede foderkasser, hvis bekæmpelsen foregår på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr og fugle.  
**Døde mus og rotter skal eftersøges og så vidt muligt fjernes i overensstemmelse med kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovdugle og rovdyr. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus eller rotter. Må kun anvendes i og omkring bygninger.**

## OPBEVARING

Produktet bør opbevares mørkt og køligt. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

## FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.  
Tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

## FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

**Bivirkninger ved indtagelse :** Ingen umiddelbare bivirkninger. Forsinkede bivirkninger: Blege slimhinder i mund og øjnelåg.  
**Ved indtagelse :** Skyl munden med vand. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge og vis emballagen eller etiketten.  
I tilfælde af kontakt med øjne eller hud vaskes øjeblikkeligt grundigt med vand.  
**Oplysning til lægen :** Dette produkt indeholder en antikoagulant. Behandling med vitamin K1 kan være påkrævet over en længere periode.  
I nærstilfælde, ring øjeblikkeligt til skadestue eller giftinformationscentret for rådgivning om behandling  
Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.  
Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.

## REGISTRERINGSINFORMATION

**Registrering :** MAKI ROTTEPASTA  
**Autorisationsnummer:** Gnavermiddel BPD-reg. nr. 716-11. Aktivstoffet er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF). Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler  
Autorisationsindehaver: Liphatech S.A.S. – Bonnel – BP 3 – 47480 Pont Du Casse (France)  
**Analyse :** 50 mg/kg Bromadiolon (0.005%) (CAS no. 28772-56-7)  
**Formulering :** Pasta  
**Produkttype :** Gnavermiddel (PT14)  
**Brugerkategori :** Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen  
**Målorganisme :** Rotter (sorte og brune), mus

## H373 : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

P102 : Opbevares utilgængeligt for børn.  
P260 : Indånd ikke pulver  
P270 : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt  
P280 : Bær beskyttelseshandsker  
P314 : Søg lægehjælp ved ubehag.  
P501 : Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til lokale og nationale regulativer



ADVARSEL

