



# Talon<sup>®</sup> Soft

## Rodenticid

### BRUGSANVISNING

#### 01 Produktdata

Aktivstof	brodifacoum 0,005% w/w
Præparattype	Pasta
Fareklass	Ikke et farligt blanding
Emballage	300 g

#### 02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte og husmus i og omkring bygninger af personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter.

#### 03 Brugsvejledning

Bær beskyttelseshandsker. Anvend kun den medfølgende påføringspistol. Skær kuppelenden af røret og vær forsigtig med ikke at beskadige skruevindet. Skær den koniske plasticdysse af for at opnå en åbning på ca. 1 cm. i diameter. Skru dysen på røret, før påføringspistolen monteres. Påfør 4 g. gift i begge hjørner af giftboksen. Efter påføring skal du påføre eventuelle rester ved at køre enden af dysen mod giftbeholderen. Dæk dysen, når den ikke anvendes. Udløs trykket i påføringspistolen for at forhindre lækage. Anbring giftboksene, hvor musene og rotter er aktive, i gange eller nær reder. Boksene anbringes med ca. 5 meters mellemrum ved kraftige angreb og 10 meters mellemrum ved mindre kraftige angreb. Bokse, der indeholder giften, bør ikke anbringes nær varme rør, ovne osv. Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekaempelsen af rotter og mus på den pagaeldende lokalitet dog må der højst anvendes 200 g pr. udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker pattedyr og fugle Beskyt altid giften godt mod vejr og vind og forhindr adgang dertil fra mennesker, husdyr og dyreliv. Tjek rottefælderne med passende intervaller og fyld op med gift, som det er nødvendigt, indtil der ikke fjernes mere af giften. Ved kraftige angreb kontrolleres boksene inden for de første 7 dage og derefter hver anden uge, indtil angrebet er under kontrol. Derefter kontrolleres boksene efter behov. Ved ikke så kraftige angreb kontrolleres boksene de første 7-10 dage. Derefter kontrolleres boksene efter behov. Ma ikke benyttes til permanent bekaempelse af mus og rotter sa som forebyggende brug i sikringsordninger.

#### 04 Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå risici for mennesker og miljø, skal brugsanvisningen følges. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer og dyreføde. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes hos modtagestation eller i egnet affaldscontainer. Sørg for, at børn, fugle og dyr, som ikke skal bekæmpes (især hunde, katte, svin og fjerkræ), ikke kan komme til lokkemaden. Lokkemad skal bortskaffes på sikker vis for at mindske risikoen for, at andre dyr eller børn indtager produktet. Hvor det er muligt, skal lokkemaden fastgøres, så den ikke kan trækkes væk. Vask hænder og eksponeret hud, inklusive ansigtet før måltider og efter brug. Tiden til den biocidale virkning er 3-21 dage afhængigt af, hvor stor en mængde lokkemad der indtages. Tiden, det tager at kontrollere et angreb afhænger af forskellige faktorer såsom angrebets omfang og mulighed for, at der kommer flere gnavere ind fra det omgivende område. Led efter og fjern døde gnavere med hyppige intervaller under behandlingen, mindst hver gang lokkemaden tilses og/eller efterfyldes. Under visse omstændigheder kræves dagligt tilsyn.

#### 05 Førstehjælp

Dette produkt indeholder et antikoagulerende middel. Hvis det indtages, kan symptomerne omfatte næseblod og blødende gummer. I alvorlige tilfælde kan det forårsage blå mærker, blodansamlinger og blod i afføring og urin. I tilfælde af uheld eller hvis du føler dig utilpas, skal du straks søge lægehjælp og fremvise denne mærkat om muligt.

#### 06 Bemærkning til læge

Brodifacoum er et indirekte antikoagulerende middel. Phytomenadione og K1 vitamin virker som modgift. Bestem protrombintider ikke mindre end 18 timer efter indtagelse. Hvis de er hævet, skal K1 vitamin indtages, og dette skal der fortsættes med, indtil protrombintiden normaliseres. Fortsæt bestemmelse af protrombintider i to uger efter stop med modgift og genoptag behandling, hvis hævelse sker i det tidsrum. Kontakt det Nationale Giftcenters Informations-service for at få yderligere information.

#### 07 Bortskaffelse

Emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Døde mus og rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr.

#### 08 At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forendes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are trademarks of a Syngenta Group Company.

# 12 x 300 g e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

